

12

TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

DE

LUE VENEREA;

QUOD,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE DIGNISSIMI VICE-CANCELLARII

ARCHIBALDI DAVIDSON, S. S. T. P. P.

ET COLLEGII GLASG. PRÆFECTI;

NEC NON,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS RITE ET

LEGITIME CONSEQUENDIS,

V COMITIIS UNIVERSITATIS GLASGUENSIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

JACOBUS HAMILTON,

HIBERNUS,

CHIRURGUS,

SOC. REG. PHYS. ED. SOC.

SOC. AMER. PHY. OL. SOC. NECNON

SOCIET. HIB. PHYS. OL. SOCIUS.

AD DIEM XXX. JULII, HORA LOCOQUE SOLITIS.



GLASGUÆ,

EXCUDEBANT CHAPMAN ET LANG.

1801.



HAWTREIO WHITE, ARMIGERO,

IN COMITATU WEXFORDII

PRÆFECTUI;

PATRIÆ AMICO;

PROPTER INSIGNEM VIRTUTEM,

QUAM,

IN INSURRECTIONE,

NUPER IN HIBERNIA CONCITATA,

COMPESCENDA,

EVICIT:

ET PROPTER AMICITIAM,

QUA

EUM DIGNATUS EST;

HOC OPUSCULUM,


ANIMI QUAM GRATISSIMI,

EXIGUUM TESTIMONIUM

D. D. D. QUE

AUCTOR.





All day he roar'd, and all the tedious night
Bedew'd his couch with tears;————
————— Such ills attend ·
Obscene and bought embraces.————

ARMSTRONG.

DE
LUE VENEREA.

MORBUS quem pro dissertatione inaugurali selegi sic a Culleno illustrissimo definitur. “ Morbus contagiosus, post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustacea abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.”

Et si autem definitio jam memorata, qui-

busdam casibus satis apte applicari queat, non omnibus aequè accommodata est. Hic morbus tam varias induit formas, et symptomata ejus, nunc ad locum circumscripta, nunc per totum systema diffusa, tantum variantur, ut definitio quae omnibus bene congruat casibus, admodum difficilis est; quam autem protulit Cullenus merito inter optimas recensetur.

HISTORIA.

Multis persuasum est Columbum salutis anno 1493 hunc morbum primum in Europam advexisse; et sane haud ambigue constat, sequelos ejus ad Hispaniolam advectos, ibi morbo de quo agitur, infici. Talem autem morbum Europam ante hoc tempus infestasse, ex multis satis probabile

est*; hoc autem tenebris adhuc obvolutum, in opusculo hujusmodi fusius agitare omnino ineptum erat. Symptomata igitur qua possimus cura proxime veniunt enumeranda.

Utpote hic morbus ex concubitu morbo laborante, ut plurimum suboritur, partes viro objectas primum plerumque depascitur. In homine penis, in fœmineis labia pudendi, vagina, et clitoris primum vires morbi experiuntur: hoc autem non semper obtinet, bubo enim vel inguinis tumor ex viro venereo absorpto aliquando, etsi raro admodum primum sese ostendit. Lues venerea cursum sequentem plerumque tenet.

* Vide Fowler's Antiquity and Origin of the Venereal Disease. Chambers' Dictionary—Article—Lues Venerea.

Quatuor vel quinque diebus, post aeger contagio objectus fuerit, elapsis, titillatio molesta vel pruritus in quadam penis parte, plerumque circa glandem vel praeputium sentitur, et pars inspecta leviter inflammata apparet. His aliquamdiu persistentibus, quantitas feri sub cuticula effunditur, quae rupta in ulcus mali moris, marginibus duris, scabris stipatum, pus tenue acre continuo effundens, abiit.

Et si hoc intra tempus jam dictum postquam aeger contagio objectus fuerit, plerumque accidit, sunt tamen in quibus signa morbi ad tempus solito longius delitescunt, et hebdomadis vel etiam mensibus elapsis, aegro tale nequidquam timenti infeliciter prorumpunt. Haec ulcuscula quae ex viro venerco penem obsident, Chancres no-

minantur; modo plura, modo pauciora, secundum quantitatem veneni admotam propullulant, glandem penis plerumque tentant vel praeputium vel fraenum, aliquando sed raro radicem penis infestant, rariora adhuc sunt exempla in quibus abdomen* afficitur.

In foeminis labia pudendi, clitoris, nymphae, vel vaginae ostium his ulcusculis plerumque deturpantur; in his autem ex superficie ampliori veneno objecta, sede plus variant. Si in hoc stadio morbo perite occurratur, medicinae plerumque cedit, et forsitan nullus alius existit morbus, in quibus remedia tempestive adhibita plus valent, certioremve licet promittere curationem.

* Vide Bell on the Venereal, vol. 2.

Sin autem hoc in initio negligatur, ulcera cito in deteriora ruunt, altius agunt radices, et partes vicinas late, depascuntur. Tunc plerumque ex viro absorpto glandula unius vel utriusque inguinis intumescere incipit; et si res attente scrutetur, lymphaticum super dorsum penis ad glandulam tumefactam repens, inflammatum, durusculam et tactu dolens in conspectum venit.

Intumescencia gradatim augefcit et dolet et si progressui non obstat in tribus vel quatuor hebdomadis magnitudine multum adauctus, ad fastigium cinereus evadit, mollescit et fluctuat. Dum ad maturationem properat, bubo venerea, saepe leviter febricitat aegrotans, et suppuratione superveniente, horrores leves quidem progrediuntur. Quando ars vel natura exitum materiei

molitur bubo aliis abscessibus haud abfimilis est; si autem haud caute tractata fuerit, pus tenue, mali moris evadit, vicina excorians et hiatus quaquaversum ampliatur. Tempus quod occupat tumor hujusmodi ex initio ad maturationem varium admodum est; quippe ex aegri constitutione, corporis habitu vel aliorum morborum complicatione multum pendet. Quando bubo primum apparet, nullo ulcusculo praegresso, inter hanc et alios glandularum inguinis tumores probe dignoscere, haud leve negotium; sed postea de hoc verba faciemus, sat fuerit hic notasse hoc perrarum accidere.

Saepius autem fit ut ex ulceribus totum systema afficitur nullo bubone praegressa, quod ex ulceribus in faucibus, naribus, &c. plenius innotescit. Morbus nunc, si cura-

tio debita posthabita fuerit in aliis partibus prorumpit; fauces aliquantum dolent, et praesertim dum aeger aliquid devorat. In quibusdam dolor parum molestus est, dum in aliis haud parum molestiae aegro faceffit, quod ex gradu inflammationis pendet. Tonsilla inspecta plerumque ulcerata apparet, quae crusta lardacea * obtegitur; aliquando uvulam adurit ulcus; aliquando tam alte in faucibus infedit ut oculis conspici nequeat. Plerumque rubor erisipilatosus ulcus circumdat, quod saepe diu in eodem statu manet; in aliis exemplis late serpit vicina depascens; aliquando usque ad tubum eustachianum extendit inflammatio furditatem progenerans, et si latera ejus adherefcant furditas re-

* Swediaur.

maneant, et si morbus primarius remediis
cefferit.

Omnibus fere conceditur hunc morbum
proxime post penem vel inguen fauces ple-
rumque adoriri, sed ratio hujus alta caligine
obvoluta adhuc latet. Hac autem utcun-
que difficilis opinioni domini Bell accedere
non possum, quae ponit, “ The diluted
state of the matter not exciting that degree
of irritation necessary to its absorption, from
the glands of the groin, or if absorbed, its
being rendered so mild as not to produce
obstruction in any of the glands to which
it is applied.”

Ratio enim tumoris inguinis facilius
reddi potest ex irritatione viri utcunque di-
luti quam productio ulceris in faucibus;

funt quoque et exempla ubi ulcus faucium supervenit ulcusculis penis, nulla bubone praegressa. In hoc statu igitur virus absorptum nequaquam dilui potuit in glandulis inguinis, nihilominus nulla intumescencia glandularum abdominis ciebatur. Sunt certae partes quaedam corporis quibus lues venerea prae aliis infesta est, quare autem hoc fieret nos omnino latet. Proxime post fauces nares hoc morbo labefactantur. Aeger de obstructione in uno alterove nare conqueritur et dolor pruriens sentitur: membrana narium inspecta leviter inflammata apparet, et ulcus parvum foedum aliquando in una parte narium conspici queat, alias autem superius quam oculis subjicitur in naribus infidet et haud raro ossa spongiosa tenet. Pus parva quantitate effundit, et si in ossibus inheret, hoc tenue et fanic com-

mixtum evadit, et portiones offium carie erosae e naribus expelluntur, dum sanies foetida qualis his offibus accidit continuo effunditur.

Ductus lacrymalis hoc modo inflammatione correptus obstruitur et lacrymae exinde per genas labuntur. Morbo progrediente, offibus carie exesis, nares turpissimae visu! hiatum horrendum relinquentes, inhoneste collabuntur. Nunc circa os faevit lues inveterata nec ulli parcit parti, sed palatum primum plerumque adoritur; color lividus circa hanc partem percipitur, qui brevi in ulcus definit. Offa solito sed cursu * citatiore cariosa evadunt, et lingua propter

* Omnia offa tenuiora, quippe cancellis destituta, citius cariosa evadunt.

vicinitatem mali fit particeps et ulceribus obfidetur.

Corporis superficies nunc morbo tentatur; pruritus circa partes corporis superiores, puta cervicem, brachia vel pectus plerumque primum percipitur; pars pruriens attentius perpecta, maculis coloris cupri super corporis superficiem elevatis deturpari videtur. Hae aliquando sponte evanescunt, iterum forsan ad easdem partes rediturae, sed saepius humeros, femora, manus vel pedes obfidet et pruritu molesto potiusquam dolore aegrum anxium tenent, et pulvis squamosus * ex iis decedit. Ubi sponte decedunt cutis parum injuriae accipit; sed auctis viribus iterum plerumque

* Anglice, Bran-like.

redeunt; cutis tunc magis turget, inflammatur, et crusta obducitur, sub qua pus formatur quod per latera scabiei exitum sibi molitur: exuvie squamosa tandem deposita, ulcus venereum, scabrum, duris marginibus oblitum saepe foedissimum in conspectum venit. In hoc morbi stadio pustulae numerosae in corporis superficie apparent, quae aliquando plena vel pauciora in unum confluentes, ulcera foeda, iis quae ex maculis oriuntur haud absimilia, progignunt. Haec ulcera aliquando formantur, nullis maculis neque pustulis praegredientibus; hoc autem perrarum est; quando accidit discoloratio cutis levis anteit, quae brevi in ulcus foedum late serpens abiit. Haec ulcera ex iis quae formantur ante lues corporis systema pervaserit multum discrepant; posteriora enim magis albescunt, dum pri-

ora quae corporis superficiem occupant, fordidum et lividum exhibent colorem, et materiem foetidum plerumque viscidum, nunc autem ita tenuem et acrem ut partes vicinas excoriat, effundunt. Haec saepe tam fordide squalent ut detergentia efficacissima parum valeant, et sola salutis spes in mercurio strenue adhibito, posita est.

Et si virus quae corporis superficiem ulceribus venereis inficit cutem et membranam cellulofam plerumque invadit, partes aliae molles non ex eo immunes evadunt; et in statu provectiore nullis fere parcit partibus, et tendines, fascias musculorum, periosteum, &c. corripit.

Si ad remedia idonea etiam in hoc morbi statu decurratur plerumque cedit Lues;

Si autem haec negligentur vel minus perite adhibeantur, tumores duri et rotundi, nodi vulgo nuncupati, ossa praesertim quae musculis parcius obteguntur, obsident: os frontis, pars media tibiae anterieus, et ossa cubiti et manus saepius corripuntur. Dolor levis in parte affecta plerumque sentitur, quae examini subiecta tumorem plerumque continet, et dolor pro magnitudine intenditur; tumor molem glandis majoris aemulans tandem rumpitur, et os carie vitiatum invenitur: dolor nodi in hoc statu ante rupturam acrius saevit ex periostei distensione; partis autem ruptae dolor mitigatur. Tuberculae circa anus et partes generationis haud raro in provectiore morbi stadio prorumpunt; colore sunt subfusci, ad apicem angulari et veruncis quae manus de-

turpant vel penem ex gonorrhœa obfidet
multo majores.

Cum ad extremum fere perventum est
omnes corporis humores vitiantur; aeger
fœtidum exhalat odorem et gravissimis cu-
mulatus malis mortem enixe exoptat, alia
accedunt symptomata pessimum quodque
indicantia; capilli squamulis ad radicem ob-
fessi decidunt, etsi aeger praeter spem con-
valescat crines nunquam recuperat: caecitas
ex vitio nervi optici lue venerea invetera-
tae aliquando supervenit; haec nunc subito
invadit nunc tarde obrepit. Surditas su-
pervenit quando affectio venerea faucium
inflammationem tubo eustachiano impertit;
quando latera hujus conglutinantur surditas
permanens est, hac autem saepius ad tem-
pus solum perstat, tunicis majorem crassitu-

dinem solummodo adeptis. Si quod aliquando accidit ossa auris carie corrupta fuerint et materies mali moris ejicitur, ossa tandem expelluntur et surditas per vitam duratura obtinet. Sunt et alia symptomata medicis notata; materies glutinosa ex oculis continuo exudit palpebras saepe conglutinans et lacrymae per genas gliscunt. Febris hectica tandem cum jam vires morbo succubuerunt, mortem anxie speratam jam adesse denunciens, supervenit, et macie, squalore et ulceribus horridus aeger lumen ingratum haud invite deferit.

DIAGNOSIS.

Quoniam nullum fere existit signum lue venerea ita proprium quin cum aliis morbis confundi queat, et revera confundere-

tur; proximum est discrimen quod inter hos intercedit quantum fieri potest notasse.

Chancre vel ulcus venereum quod organa generationis infestat aliquando cum aliis harum partium ulceribus confundi periclitatur; si autem ad historiam morbi, ad connectionem aegri cum iis morbo laborantibus et duros margines angulatos, et albidam irregularem basim quem habet ulcus venereum animum advertamus, haud difficile, est discrimen inter haec stabilire: Praeterea ulcus venereum aliis remediis parum auscultans, mercurio adhibito, cito in melius vertitur.

Bubo. Hac difficiliter secernitur ex aliis inguinis tumoribus, puta hernia, tumoribus scrophulosis, abscessibus lumborum,

intumescentiis glandularum ex ulceribus crurum vel pedum: inter haec discrimen aliquod affere nunc conabimur.

Bubo ex hernia in his discrepat, ex initio dura est tunc parum dolet et circumscripta est; alvus non adstringitur, ad anulum obliqui externi originem ejus petere non possumus, neque nausea stipata est quae herniam vulgo comitatur.

Tumores scrophulosi proclivitate corporis et historia morbi probe perpenfis raro cum bubone venerea confundi queant; aliquando autem tumores scrophulosi et ulcera in praedispositis bubonibus venereis superveniunt, et tunc de natura horum magis ambiguitur, neque prius in animum venit scro-

phulum fubeffe, quam mercurio du adhibito pertinaciter refiftunt.

Si quando bubo venerea, in habitu corporis fcrophulo prono, oriatur, indolis plerumque mollioris eft et magnitudine multum fuperat bubonem in hanc proclivitatem carentibus, neque tantum dolet, nec colore plerumque ita vividus.

Ex abfceffibus lumborum bubo facile fcerni queat, fede doloris, febre et debilitate quae illos comitantur, rite perpenfis: bubo enim glandulas, abfceffus ille fubftantiam cellularem occupat. Bubo etfi eafdem glandulas occupans aliam caufam praeter virum venereum, ulcera nempe pedum vel crurum agnofcit; plerumque autem glandulae inguinum inferiores bubonibus huiusmodi infeftantur, dum aliae superiores

plurimum petunt; ulcera quoque in artibus inferioribus detecta ad diagnosin haud parum conferunt. Dom. Swediaur* casum luis venereae male tractatae in ulcera pedum prorumpentis narrat, quae materia absorpta ad glandulas inguinis iterum ascendebat; sed animum ad historiam morbi advertendo hic decipi nequimus.

Ulcerata venerea in faucibus aliquando cum iis quae ex inflammatione membranae mucosae progignuntur confundi possunt; specie autem multum discrepant; ulcera enim ex viro venereo fordida sunt, et crusta lardacea obteguntur, dum quae ex inflammatione procedunt florida sunt colore neque marginibus scabris, illis ita propriis, comi-

* Vide Swediaur on the Venereal.

tantur: historia quoque praegressa si quando ambiguitur litem adimat et si dubium restaret ad hydrargyrum confugiendum est quo diagnosis brevi innotescat, et in hoc statu mercurius tantam corpori nequaquam inferri potest injuriam, quantam ex eo posthabito, si ulcus venereum evaderet, oriretur.

Ulceras narium et oris quae ex lue venerea proveniunt aliquando cum aliis harum partium affectionibus, praesertim cum malis quae ex cancre oriuntur, commisci queant: ex historia autem morbi, ex duris marginibus schirrosis, et colore fordido et subfusco quae haec prae se ferent, ex tali confusione cavere plerumque possumus; dolor quoque lancinans qui cancrum comitatur haud parum ad diagnosis stabilendum valeat.

Maculae quae ex lue venerea procedunt cum eruptionibus herpeticis facilius confundi possunt; si res autem examini subiecta fuerit, maculam veneream, herpeticam nunquam magnitudine adequare apparebit; hac annulum quoque plerumque format, parte interna integra manente; locus quoque quem tenet naturam mali patefcatur; eruptio herpetica clunes, abdomen vel carpus plerumque adoritur dum maculae venereae pectus et humeros saepius invadunt; si quoque eruptio venerea fricetur squamulam vel materiem furfuraceam deponit.

Dolores quae ossa in provectiore lue venereae stadio infestant aliquando pro rheumatismo habentur, qua idonea curatio diutius saepe defertur, et aeger in majus discrimen adducitur; si autem recordamur rheuma-

tissimum juncturas primum plerumque adoriri, et etsi per ossa aliquando serpit, dolor tamen nunquam, in iis partibus quas lues venerea afficit, medium nempe tibiae, ossis frontis quae musculis minus obteguntur, incipit; tumor quoque vel nodus qui hunc dolorem in ex lue venerea egrotantibus cito comitatur, gradatim augefcans omnem ambiguitatem tollit.

Ex constitutione igitur aegri, vitae ratione, et historia morborum quibuscum confundi periclitatur natura morbi facile plerumque enititur, et in omnibus fere casibus ubi aliquid dubii restat, praestat certe hydragryrum tempestive adhibere, si non malo presenti directe adversatur; et hoc modo an sit lues venerea necne facilius innotescat et

periculum ex morbo inveterato, nullis adhibitis remediis, praecavetur.

C A U S A E.

Hic morbus multis modis communicari queat: imo. Concubitu cum quodam morbo infecto et hac via saepius concitatur. Foetus dum in utero jacet aliquando a parentibus lue afficitur. Infantes quoque ex his quae mammas iis praebeant, morbo infici possunt: et hi iterum nutricibus luem veneream aliquando impertiunt. Lues maxime inveterata quae se unquam mihi obtulit, curationi Chirurghi M^cEvoy qui Regio Nosocomio Militari apud Dublin praefectus erat, demandata est, et ex vestibus cujusdam qui morbo laboraverat aegro indutis oriebatur. Modo autem primum

D

memorato morbus plerumque excitatur; et quoniam passim fere conceditur materiem * quae gonorrhaeam ex ea quae luem veneream concitari queat, differe, hanc, ad luem concitandam solam valere, patebit.

Disceptatur an hic morbus, si non externe proruperit alio communicari queat; hoc autem accidere posse omnino probabile est; si enim in constitutione aegri penitus infederit, morbus se tandem manifestet, necesse est, et quid vetat quo minus fluida hujus sic vitiata, alium ejusdem vitii participem fierent.

* Dr. Hamilton Ipswichiensis multa super se et alios instituit experimenta hujus rei indagandae consilio, et comperit se nunquam invicem concitari.

Causae hujus morbi remotae non aequo, ac in aliis morbis, accidit jure; in eas quae proclivitatem dant, et quae morbum proclivibus concitant separari queant: sunt sane conditiones quaedam corporis quae morbum vel exasperant vel mitiorem reddunt, sed nullus existit tam valida corporis indole praeditus, quin causa excitante admota in morbum inciderit; constat autem, quaecunque fuerit causa, ex multis qui cum eadem foemina certamen veneris incierunt, unum solum vel alterum morbum accepisse, et perhibetur, non sine causa, eos qui jam morbo laboraverant creditui eo fieri obnoxiores.

CAUSA PROXIMA.

Hujusmodi, utut aliorum, causa proxima tenebris immerisa latet. Multi sane ratio-

nem modi quo virum venereum systema afficit, reddere conati sunt, sed parum adhuc profecerunt; quibusdam persuasum est fermentationem in fluidis excitari, hac autem opinio refelli vix meretur; ut enim fermentatio, sensu vulgo recepto, locum habuerit, quaedam sunt necessaria, quies nimirum, aeris aditus, &c. quae in sanguine obtinere nequaquam possunt. Haud forsitan omnino ineptum est credere virum venereum fluida corporis sibi assimilando ut in variola accidit, agere.

CURATIO.

Ex tempore quo primum usus mercurii innotuit omnibus aliis remediis merito antepositur, neque ullum praesentius remedium existit; nunquam enim si tempestive

in auxilium vocatus fuerit, spem medici fallit. Quoniam autem mercurius omnes secretiones praesertim glandularum salivalium multum adauget, et ita adhibitus ut morbum penitus eradicet, vires aegri saepe admodum convellit, nec raro eas penitus subruit, medici haud parum laboris impenderunt ut remedium virtutibus ejus praeditum, vitiis destitutum, invenirent; hinc opium et alia medicamina suos habuerunt fautores; experientia autem ea fere omnia damnavit, et sola salutis spes in hydrargyro merito posuerunt medici, donec opinio nuper apud nonnullos medicos recepta invaluit, hydragyrum nempe, in hoc morbo, bonos praestare effectus, oxygenium, quod varia ejus praeparata continet, corpori largiundo; et si verba derisoris hujus theoriae

citare licet, "that,* strictly speaking, mercury never did any good at all, and it is maintained, that it is not the mercury itself, but something united with it, a kind of air, oxygen, which has done so much good, and which may be found in much greater quantity, and in much larger proportion in the purest air we breathe, in pure spring water, and in aquafortis". Mercurium autem, hunc morbum oxygenio quod continet, revera profligare dubium admodum apparebit, si nobiscum reputamus formam hujus remedii quae maximo fructu exhibi solet, parum oxygenii continere: unguentum mercuriale praeparatur trititando unguentum porcinum cum hydrargyro donec glo-

* Gregory's Memorial to the Managers of the Royal Infirmary of Edinburgh.

buli hujus penitus dispareant, quod certe unioni ejus cum oxygenio parum favet. Utcunque hoc erit, hac opinione innixi, multas substantias, quarum oxygenium pars est, medici quidem in hoc morbo experti sunt, inter quas acidum nitricum eminet, et etiam praeter spem fautorum hujus opinionis maxime tenacium, hoc bonos praestare effectus visum est. Dr. Beddoes in libro quem typis vulgavit, duodecim luis venereae narrat casus hoc remedio feliciter tractatos, currante Dre. Geach ad Nosocomium Regium apud Plymouth; et eos, ut maxime idoneos ad vires hujus remedii demonstrandas, selectos fuisse, credere fas est.

Horum septem, nullo mercurio usurpato, feliciter convaluerunt et alii etsi mercu-

rium priusquam in nosocomium admissi fuerant, adhibuerant, ad sanitatem usu acidi nitrici perducti sunt: fat autem temporis ante evulgationem horum non effluxit, ut plene constat an morbus, hoc remedio sopitus penitus profligatur, nunquam rediturus; eum autem iterum esse erupturum ex experientia Doctoris Rutherford probabile est. Etsi enim acido, morbus ad tempus consopitus, usu autem ejus deposito nova vi rediebat et exhibitione ejus resistebat, mercurio autem feliciter cedebat.* Quosdam autem casus narrat in quibus effectus optimi ex mercurio et acido nitrico conjunctis profluxerunt, ubi seorsim parum valebant, et aeger in tam lubrico versabatur statu, ut

* Vide Rutherford's Letter to Dr. Beddoes.

ne morbo succubuerat, timendum erat*.

Dr. Rutherford quoque memorat hoc remedium in casibus admodum levibus saepe spem fallere, dum in gravioribus optimas habuisse effectus, et hoc corroboratur Dre. Geach qui morbum in quinquagintis casibus curavit†. Ex omnibus his colligere fas est acidum nitricum luem veneream saepe profligasse; in casibus haud gravibus saepe parum auxilii attulisse, et in aliis, mercurio per se parum valente, cum acido nitrico conjuncto, curatio feliciter absoluta est. Hinc facile cogitur, etsi medici perperam huic remedio solo confisi sunt, id haud parum prodesse praesertim in debilibus, si cum mercurio conjunctum fuerit;

* Rutherford, loco citato.

† Beddoes' Cases.

et his casibus solis fas est hoc remedio utere.

Praeparata hydrargyri quae maxima vi in hoc morbo debellando praedita sunt, proxime veniunt perpendenda; in statu enim metallico, nisi quantum mechanice agat, pene iners est.

Hydrargyrus efficax redditus est, imo. Trituratione, qua globuli mercurii minutim dividi queant, ut unguentum hydrargyri.

2do. Calcinatione, ut hydrargyrus calcinatus.

3tio. Ope salium, ut hydrargyrus muri-

atus corrosivus et hydrargyrus muriatus mitis.

Ex omnibus hydrargyri praeparationibus ea quae ex trituratione parantur maxima forsan vi in luem veneream pollent. Antequam progrediamur ad usum mercurii in lue venerea, effectus generales quos in corpus edit, breviter recensere licet. Inter medicamenta actuosissima locum merito obtinet; totum systema fortiter stimulat, secretiones varias, praesertim glandularum salivarium multum promovet, et liberaliter usurpatus, nauseam et febrim ciet: quaedam ex praeparatis ejus si dosi exigua administrentur nullum effectum sensibilem edunt, si autem dosis augeatur, vomitus, diarrhoea, &c. insequuntur. Effectus autem ejus in hoc morbo curando maxime notabiles sunt; salivae

secretio multum adaucta dolor et rubedo gingivarum, halitus faector, et sensus quasi cupri in ore; et si usus mercurii post hac signa supervenierunt, continuetur, omnes partes vicinae, ut lingua fauces &c. intumescunt.

Praeparata mercurii quae vulgo usurpantur, sunt unguentum hydrargyi, hydrargyrus muriatus corosivus et hydrargyrus muriatus mitis; et hoc inter optimos quae interne assumuntur merito habetur.

Nunc de usu horum in diversis luis venereae symptomatibus summovendis verba facere licet. Quando morbus recens est, et ulcus topicum solum apparet, ad causticum forsan rite, decurritur, quo ulcus penitus extirpatur; eodem tempore pillulam caeru-

leam ter in die ad quantitatem grani mercurii pro dosi assumi debet; vel granum hydrargyri muriati mitis sub forma pillulae haud male convenit. Hoc modo ulcus plerumque evanescit, et si os leviter affectum per decem vel duodecim dies teneamus, morbus plerumque omnino disparet.

Haud raro autem bubo ex viro venereo absorpto concitatur, et tunc ad frictionem cum unguento hydrargyri confugiendum est; perhibent fane quidam bubonem certius excitari, si ulcus causticis vel escharoticis eradicatum fuerit; si autem hoc revera ita esset, quid obstat quominus mercurius per quosdam dies exhibeatur et sic ne systema lues inficeret, cavetur; et hoc certe melius est, quam mercurium interne assumendum precipere donec ulcus dispareat, quod

fane hujus quantitatem multo majorem, quam aliter necessarium foret, postulat.

Bubo. Quando ex viro absorpto bubo oritur ad eam discutiendam eniti debemus; et hoc consilio mercurius ita administrandus est, ut quamprimum in contactum cum viro veniat, et hoc fit unguentum hydrargyri in femur lateris affecti assidue fricando, quo lymphatica id directe ad glandulam deferunt. Si unguentum hydrargyri fortius fricetur cito plerumque femora excoriat; in hoc statu unguentum mitius conveniet, quod in utrisque femorum abundantius fricari queat. Si medicus tempestive arcessitur, remediis perite adhibitis morbus plerumque auscultat, et bubo discutitur; sin minus ad suppurationem properat; et cum maturatur, in eam incidere qua exitus

materiei paretur melius est; quod causticis, vel tumoris rupturae, anteponi debet; in illo enim vulnus quantum fieri debet, circumscribere difficile est et ruptura orificium scabrum, egressui puris inidoneum plerumque paratur. In hoc quoque statu mercurius secundum vehementiam morbi, usurpandus est, et nunquam ex animo exire debet, majorem quantitatem mercurii esse necessariam post ulcera, ex hoc topice admotata, convaluerunt, quam ubi ex eo interne assumpto disparuerunt.

Quando ulcera ex lue venerea in faucibus sese ostendunt, et speciem usitatam praebent, ad frictionem mercurii statim confugiendum est quae in plerisque casibus usu ejus interno plus valebit: si quando autem haec ulcera, remedio hoc modo prae-

scripto non facile cedunt, et partes vicinas depascere minitantur fumigatio cum cinabari vel quodam alio ex praeparatis mercurii, huic fini accomodato in auxilium advocanda est. Si aditus ad ulcera facilis est tunc caustica cum mercurio conjuncta, curationem citius absolvunt; quando autem tam alte sese abdunt, ut hoc non fieri potest, enitendum est ut ex fordibus depurgantur, quae diutius malum haud parum exasperare solent. Ut alia symptomata quae lue laborantes infestare solent in salutem cedant, mercurius etiam adhibendus est, et in provectione morbi gradu cum vires multum defecerunt, omni cura incumbendum est, ut corpus roboretur quo melius incommodis, quae ex mercurio diu usurpato saepe progigni solent, occurratur.

Guaiacum haud parva vi contra hunc morbum pollere creditum est, sed usus ejus quibusdam affectionibus solis merito nunc circumscribitur, ut maculis, &c. et tunc sarsaparilla feliciter conjungitur. In quibusdam hujusmodi casibus haud parum saepe prodest, praesertim si cum mercurio conjunctum fuerit. Sunt et alia remedia quae in hoc morbo usurpata fuere; quae autem jam perpenſa sunt medici solum nunc confidunt. Omnibus igitur quantum limites opusculi finerent enarratis, id utcunque imperfectum ad finem perducere fas est.



ERRATA.

- P. 19. *pro* tuberculae; — tubercula.
 — subfusci, — subfusco.
 — angulati, — angulatis.

